









ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE NICARAGUA 2022

Vacunas	Enfermedad que Previene	Edad de la Vacunación	Número de Dosis	Dosis de Refuerzo	Aplicación
BCG 	Formas Graves de Tuberculosis	Recién Nacidos	1 Dosis (0.05 cc)	Ninguna	Intradérmica, en el tercio superior del área del deltoide del brazo izquierdo. Jeringa 0.05cc X 26G X 3/8"
Antipolio Inyectada (IPV) 	Poliomielitis	2 y 4 meses	2 Dosis (0.5 cc)	Ninguna	Intramuscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo. Jeringa 0.5cc X 23 G X 1"
Antipolio Oral (OPV) 	Poliomielitis	6 meses	1 Dosis (2 gotas)	Una dosis a niños de 18 meses	Oral
Pentavalente DPT/HB+Hib 	Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis B, Meningitis y Neumonía causada por Haemophilus Influenzae Tipo b	2,4 y 6 meses	3 Dosis (0.5 cc)	Ninguna	Intramuscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho. Jeringa 0.5cc X 23 G X 1"
Rotavirus 	Diarrea grave por Rotavirus	2 y 4 meses	2 Dosis (1.5 cc)	Ninguna	Oral
Neumococo 	Neumonía, Meningitis y otras enfermedades causadas por los serotipos que contiene la vacuna	2,4, y 6 meses	3 Dosis (0.5cc)	Ninguna	Intramuscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo. Jeringa 0.5cc X 23 G X 1"
MMR (SRP) 	Sarampión, Rubéola y Parotiditis	12 y 18 meses	1 Dosis (0.5 cc)	Ninguna	Subcutánea, parte superior del brazo (área del deltoides). Jeringa 0.5cc x 25 G X 5/8"
DPT 	Difteria, Tos ferina, Tétanos	18 meses (al año de 3era dosis de pentavalente) 6 años	1 Dosis (0.5 cc)	Ninguna	Intramuscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo. Jeringa 0.5cc X 23 G X 1"
dT 	Tétanos y Difteria	10 años 20 años (o primer embarazo en caso de las mujeres)	1 Dosis (0.5 cc)	Si no tiene registro de haber recibido el esquema básico, aplicar una segunda dosis con intervalo de 4 semanas, una tercera dosis a los 6 meses, una cuarta dosis un año después de la tercera y una quinta dosis un año después de la cuarta dosis.	Intramuscular parte superior del brazo. (área del deltoides) Jeringa 0.5cc X 22 G X 1"
Influenza 	Gripe estacional Pediátrica Gripe estacional Adulto	6 a 23 meses con enfermedades crónicas 50 años y más con enfermedades crónicas Embarazadas (primer contacto con los servicios de salud Personal de Salud en atención directa de pacientes	1 Dosis (0.25 cc) 1 Dosis (0.5 cc)	Vacunación anual	Intramuscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo. Jeringa 0.5cc X 23 G X 1" Intramuscular en la parte superior del brazo. (área del deltoides) Jeringa 0.5cc X 23 G X 1"
Neumococo 23 valente 	Formas graves de neumonías causada por los serotipos contenidos en la vacuna	50 años con enfermedades crónicas	1 Dosis (0.5 cc)	Vacunación anual	Intramuscular en la parte superior del brazo. (área del deltoides) Jeringa 0.5cc X 23 G X 1"

