




Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

MINISTERIO DE SALUD

LA



TUBERCULOSIS

SE CURA CON EL

TRATAMIENTO

JUNTOS

VENCEMOS

LA TUBERCULOSIS

“

El que no se sienta

Orgulloso

de lo que

hemos hecho

a lo largo de
nuestra historia,

de cómo hemos

resistido

para

vencer,

no tiene Patria

”

Compañera Rosario Murillo
Co-Presidenta de Nicaragua



¿QUÉ ES


LA TUBERCULOSIS?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria conocida como bacilo de koch, que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede dañar otras partes del cuerpo como el cerebro, los huesos y riñones.

Esta enfermedad tiene cura si se detecta y se atiende oportunamente.

¿QUÉ ES

LA TUBERCULOSIS?



Conozcamos los síntomas más comunes que padecen las personas cuando tienen

TUBERCULOSIS



Tos por más de 14 días.



Fiebre y sudoración por las noches.



Falta de apetito.



Pérdida de peso.



Cansancio y decaimiento.

Los síntomas de la tuberculosis pueden comenzar de forma leve y pasar desapercibidos durante algún tiempo. Si presenta alguno de estos síntomas, acuda a la Unidad de Salud de su barrio o comunidad para recibir atención gratuita y tratamiento oportuno.

Conozcamos los síntomas más comunes
que padecen las personas cuando tienen

TUBERCULOSIS

Tos por más de 14 días



Cansancio y decaimiento



Fiebre y sudoración por las noches



Pérdida de peso



Falta de apetito



¿CÓMO SE TRANSMITE

LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis se transmite cuando una persona enferma tose, estornuda o habla, sin cubrirse la boca o usar mascarilla.

La tuberculosis, se transmite de persona a persona, a través de las gotitas de saliva.

¿CÓMO SE TRANSMITE

LA TUBERCULOSIS



¿QUIÉNES SE PUEDEN ENFERMAR DE TUBERCULOSIS?

La tuberculosis, puede afectar a cualquier persona, sin importar su edad, sexo o lugar donde viva.

Sin embargo, algunas condiciones pueden aumentar el riesgo de enfermarnos con tuberculosis, como tener las defensas bajas, padecer enfermedades crónicas, vivir con VIH, tomar alcohol sin control o consumir drogas.

¿QUIÉNES SE PUEDEN ENFERMAR DE TUBERCULOSIS?



Más de 14 días con tos

Si la tos persiste por más de 14 días, acuda de inmediato a la Unidad de Salud de su barrio o comunidad para recibir una valoración médica y si corresponde, le realicen los exámenes que permitan confirmar o descartar la enfermedad.

Más de 14 días
con tos



¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS QUE REALIZA EL MINSA PARA DETERMINAR SI TENEMOS TUBERCULOSIS?

Según la evaluación médica, a las personas que presentan síntomas relacionados con la tuberculosis se les puede indicar la realización de una baciloscopia, una prueba Xpert o una radiografía de tórax, de acuerdo con cada caso.

El examen más común para diagnosticar la tuberculosis es la baciloscopía, que consiste en el análisis de dos muestras de esputo (gargajo) del paciente con síntomas de tuberculosis.

Nuestra Revolución Popular Sandinista, garantiza la realización de estos exámenes de forma gratuita.

¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS QUE REALIZA EL MINSA PARA DETERMINAR SI TENEMOS TUBERCULOSIS?



Nombre del Paciente:

**Examen de
Baciloscopía**

EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE

LA TUBERCULOSIS NOS PERMITE !



Evitar la transmisión de la Tuberculosis a otras personas.



Iniciar el tratamiento oportunamente para que la enfermedad no avance.




Evitar complicaciones que pongan en riesgo nuestras vidas y la de nuestra familia.

En Nicaragua, el tratamiento para la tuberculosis es gratuito, seguro y está disponible en todas las Unidades de Salud del país.

EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE

LA TUBERCULOSIS NOS PERMITE!






¿Qué pasa cuando no se diagnostica oportunamente

LA TUBERCULOSIS?

- 🫁 Seguimos transmitiendo la enfermedad a nuestra familia y a la comunidad.
- 🫁 Pueden quedar daños permanentes en nuestros pulmones.
- 🫁 Podemos padecer complicaciones graves, que pongan en riesgo nuestra vida.

¿Qué pasa cuando no se diagnostica oportunamente

LA TUBERCULOSIS?



LA TUBERCULOSIS

se cura con el tratamiento

Si los exámenes confirmatorios de tuberculosis resultan positivos debemos iniciar inmediatamente el tratamiento.

El tratamiento para la tuberculosis consiste en la administración diaria y supervisada de pastillas durante 6 meses, hasta que la persona este curada.

LA TUBERCULOSIS

se cura con el tratamiento



La tuberculosis, sólo se cura cuando se toma el tratamiento completo y a como nos lo orienta el personal de salud.

ESTRATEGIA TAES

El Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado


El tratamiento para la tuberculosis es administrado a la persona mediante la estrategia TAES, que consiste en entregar “en boca” las pastillas al paciente.

El tratamiento es administrado y supervisado por el persona de salud o brigadista de la red comunitaria, para asegurarse que la persona tome el tratamiento en tiempo y forma.

Esto garantiza la curación de la persona y es una manera de evitar que abandone el tratamiento.

ESTRATEGIA TAES

El Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado



Las personas con tuberculosis deben recibir el tratamiento completo para curarse.

Visitas Casa a Casa

DE BRIGADISTAS Y PERSONAL DE SALUD

Las visitas casa a casa permiten captar oportunamente a personas que presentan síntomas de tuberculosis, orientarlas para que acudan a la Unidad de Salud y brindar información para prevenir la enfermedad en la comunidad.

De la misma manera, el personal de salud debe realizar la búsqueda activa de las personas con sospecha de padecer tuberculosis, y así realizarles las pruebas necesarias.

Visitas Casa a Casa

DE BRIGADISTAS Y PERSONAL DE SALUD



El personal de salud
en la búsqueda de personas con

SÍNTOMAS DE TUBERCULOSIS

De la misma manera, el personal de salud debe realizar la búsqueda de las personas con síntomas de tuberculosis en las unidad de salud, barrios y comunidades, para que les realicen las pruebas correspondientes.

El personal de salud
en la búsqueda de personas con

SÍNTOMAS DE TUBERCULOSIS



Preveníamos

LA TUBERCULOSIS



La tuberculosis se puede prevenir con acciones sencillas que protegen a toda la familia.

-  Acudir a la Unidad de Salud si la tos dura más de 14 días.
-  Completar el tratamiento hasta el final.
-  Mantener los ambientes ventilados.
-  Cubrirse la boca al toser o estornudar.
-  No escupir en el suelo.
-  Lavarse las manos con agua y jabón.

Prevenir la tuberculosis es una responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el personal de salud.

Prevenamos

LA TUBERCULOSIS



ELIMINANDO EL ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

Las personas con tuberculosis merecen respeto, comprensión y apoyo.

La discriminación puede hacer que muchas personas retrasen la búsqueda de atención o abandonen el tratamiento.

Debemos brindar acompañamiento, y un trato digno para favorecer la recuperación y ayudar a prevenir nuevos casos de tuberculosis en la comunidad.

ELIMINANDO EL ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN



**SE NECESITA EL APOYO DE
LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD**

Estilo de


VIDA SALUDABLE

Durante el tratamiento de la tuberculosis, el cuerpo necesita fortalecer sus defensas para recuperarse. Por eso, es importante consumir alimentos saludables que estén al alcance de la familia, como frijoles, huevos, queso, leche, pollo, pescado, frutas y verduras.

Evitar el consumo de tabaco, el alcohol o drogas ayuda a que el tratamiento sea más efectivo y favorece una recuperación completa.

Estilo de

VIDA SALUDABLE



También se recomienda dormir bien, mantener una buena higiene personal, ventilar diariamente la vivienda y realizar actividad física cuando el personal de salud lo indique.

Mitos y realidades sobre

LA TUBERCULOSIS

MITOS

La tuberculosis se transmite si se le da abrazos, besos o la mano a una persona con la enfermedad.

La persona con tuberculosis debe estar aislada de su familia y amistades.

La persona con tuberculosis debe lavar sus platos con cloro o comer en platos descartables.

REALIDADES

La enfermedad no se transmite por compartir abrazos, besos o dar la mano.

La persona con tuberculosis no debe estar aislada. Las redes de apoyo de familiares y amigos contribuyen a que la persona termine el tratamiento.

No hay necesidad de lavar los platos con cloro ni utilizar los descartables.
Se deben lavar con agua y jabón, como el resto de los trastes de la familia.

Mitos y realidades sobre

LA TUBERCULOSIS



Mitos y realidades sobre

LA TUBERCULOSIS

MITOS

La ropa de las personas con tuberculosis está impregnada con la bacteria por lo que debe lavarse aparte.

Una mujer embarazada no debe recibir tratamiento para tuberculosis.

REALIDADES

La bacteria de la tuberculosis no se adhiere a la ropa por lo que no se transmite por esta vía.
No hay necesidad de quemarla ni lavarla aparte.

Una mujer embarazada puede recibir el tratamiento de la tuberculosis y tomarlo no la afecta a ella ni a su bebé.

No tomar tratamiento cuando se está enferma de tuberculosis pone en mayor riesgo la salud de la madre y del bebé.

Mitos y realidades sobre

LA TUBERCULOSIS



SOLIDARIDAD Y APOYO

El apoyo de la familia, los vecinos y la comunidad es muy importante para que una persona con tuberculosis complete su tratamiento y recupere su salud.

Acompañarla a sus consultas, animarla a no abandonar los medicamentos y tratarla con respeto y cariño fortalece su recuperación.

Cuando una familia permanece unida y una comunidad brinda apoyo, es más fácil que la persona supere la enfermedad.

SOLIDARIDAD Y APOYO



FSLN

Los Grupos de Apoyo

Los grupos de apoyo son espacios donde las personas con tuberculosis y sus familias reciben orientación y acompañamiento durante el tratamiento.

En estos encuentros se realizan talleres de escucha solidaria y participan trabajadores de la salud, brigadistas, familiares y personas que ya lograron curarse de la tuberculosis, quienes comparten sus experiencias y demuestran que esta enfermedad tiene cura cuando se cumple el tratamiento.

Los Grupos de Apoyo

